

lovci mogu poduzeti kako bi riješili pojavu i širenje bolesti?

U slučaju uginuća ili promijenjenog ponašanja divlje svinje mora biti prijavljen nadležnoj veterinarskoj organizaciji u svrhu uzorkovanja u laboratorij i pretraživanja u cilju isključivanja ASK. U rizičnim i zaraženim područjima značajan rizik od daljnjeg širenja bolesti predstavljaju proizvodi od divljih svinja i trofeji. Zbog toga su se svi lovci dužni pridržavati biosigurnosnih mjera:

Osigurajte da su ostaci (otpad) odstrijeljenih divljih svinja zbrinuti na odgovarajući način!

Izbjegavajte kontakt s domaćim svinjama nakon lova!

Provjerite se da su odjeća, obuća i oprema (npr. pribor, vozila, prijevozna sredstva) koji mogu biti zaraženi krvlju divljih svinja, dobro očišćeni i dezinficirani!

Nemojte donositi meso, mesne proizvode, trofeje, kožu, kosti i druge materijale koji su mogli biti u kontaktu s divljim svinjama u lovište!



Što bi posjednici svinja trebali poduzeti kako bi zaštitili svoje svinje?

- Obavezno provodite biosigurnosne mjere na svojim gospodarstvima!
- Ne hranite svinje napojem (kuhinjski ili restoranski otpad s ostacima hrane životinjskog podrijetla)!
- Neškodljivo uklonite otpad nastao klanjem svinja za vlastite potrebe na odgovarajući način da se spriječi kontakt drugih životinja s otpadom!
- Odmah prijavite veterinaru svaki znak bolesti u svinja, pobačaje ili uginuća!
- Svinje držite u zatvorenom ili ograđenom prostoru tako da je onemogućen svaki kontakt s drugim životinjama, a posebno s divljim svinjama!
- Svinje kupujte samo iz registriranih gospodarstava sa svom potrebnom dokumentacijom, a nakon dopreme držite novonabavljene svinje najmanje 14 dana odvojeno od drugih svinja na gospodarstvu!
- Ne dopuštajte ulazak neovlaštenim osobama i posjetiteljima na vaše gospodarstvo i ne dopuštajte da dolaze u kontakt sa svinjama!

Postoji li cjepivo ili liječenje ASK?

Za ovu bolest nema cjepiva niti učinkovitog lijeka.

Unos mesa i mesnih proizvoda iz drugih država može dovesti do unosa i širenja bolesti!

Ne donosite meso ili mesne proizvode iz drugih država, posebno ne iz onih zaraženih ASK kako ne bi došlo do unošenja virusa ASK ili drugih bolesti životinja u našu zemlju!

Putnici (turisti) moraju sve ostatke hrane odložiti u odgovarajuće zatvorene spremnike za otpad na granici kojima domaće i divlje svinje nemaju pristup.

Više informacija o zdravlju životinja dostupno je na:

- mrežnim stranicama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane: <http://www.veterinarstvo.hr>
- E-mail adresi: veterinarstvo@mps.hr ili kontaktom na telefon: 01 6443 540



MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

AFRIČKA SVINJSKA KUGA PRIJETNJA SVINJOGOJSTVU



Kakva je bolest afrička svinjska kuga?

Afrička svinjska kuga (ASK) je zarazna virusna bolest domaćih i divljih svinja koja uzrokuje velike ekonomske gubitke u sektoru svinjogojstva. Bolest je bila ograničena na područje Afrike, a od 2007. godine se proširila na područje Gruzije, a zatim se dalje proširila na zapad (obuhvaćajući Sjevernu i Središnju Europu) i na istok. Bolest se proširila u sjevernim državama Europske unije (Njemačka, Mađarskoj, Češkoj, Bugarskoj i Rumunjskoj) i u Republici Hrvatska postaje ozbiljno opasna.

Še vrste životinja mogu oboljeti?

Bolest ASK može izazvati infekciju i pojavu znakova bolesti isključivo u domaćih i divljih svinja.

Je li bolest opasna za ljude i druge životinje?

Bolest ASK ne izaziva bolest u ljudi niti u drugih životinja.

Što je uzročnik ASK?

Uzročnik ASK je virus koji je vrlo otporan i može preživjeti duži vremenski period (mjesecima, čak i godinama) u okolišu, izmetu, mesnim proizvodima (zamrznutim, soljenim, dimljenim i nedovoljno termički obrađenim) i lešinama domaćih svinja. Međutim, virus učinkovito uništavaju dezinfekcijska sredstva, kao što je formaldehid, 2% NaOH ili parafenil fenol. Komercijalno dostupni dezinficijensi koji se mogu koristiti prema uputi proizvođača.

Kako se prenosi ASK?

Divlje i domaće svinje mogu se međusobno zaraziti izravnim kontaktom, posebno putem krvi zaražene svinje. Svinje se mogu zaraziti i konzumiranjem nedovoljno termički obrađenih proizvoda od svinjskog mesa, strvina ili napoja. Do zaraze može doći i neizravno, putem zagađenog alata i opreme (odjeća, obuća, noževi, prijevozna sredstva, i dr.).

Koji su klinički znakovi bolesti?

ASK se manifestira različitim kliničkim znakovima. Zaražene, bolesne svinje uglavnom ugibaju. Obično se javlja gubitak apetita, ležanje i nevoljkost, a svinje brzo i iznenada uginu. Rijetko se pojavljuju drugi klinički znakovi: potištenost, gubitak tjelesne težine, krvarenja na koži (vrhovi uški, rep, noge, grudna i trbušna regija), otežano kretanje i pobačaji krmača. Klinički znakovi se teže uočavaju u divljih svinja.




Krvavi proljev i crvenilo na koži vrata, grudi i nogu



Cijanoza – plavo ljubičasta boja na vrhovima uški



Krvavi limfni čvorovi



Povećana slezena